

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-001

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Lagerstroemia calyculata* Kurz.

ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ : Queen's Flower

ชื่ออื่น ๆ : ตะแบก

ลักษณะทั่วไป



ต้น : ตะแบกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ลำต้นเรียบสีขาวยเป็นมัน แต่เมื่อยามแก่ผิวของต้นจะร่อนเหมือนกับต้นฝรั่ง เนื้อไม้แข็ง ลำต้นสูงแตกกิ่งก้านสาขาอยู่ตอนบน ผลัดใบ สูง 15 - 30 เมตร



ใบ : มีสีเขียว ใบจะโต ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ใบหนาโคน ใบมน

คล้ายกับใบลั่นทมใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือเยื้องกัน เล็กน้อยใบอ่อนสีแดงมีขนสั้นอ่อนนุ่มปกคลุม ใบแก่ขนจะหลุดหายไป แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก กว้าง 5 - 7 เซนติเมตร ยาว 12 - 20 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนสอบ




ดอก : ออกดอกเป็นช่อใหญ่ เวลาที่ออกดอกต้นจะทิ้งใบ ทำให้เห็นแต่ดอก

บานสะพรั่งอยู่เต็มต้น สวยงามมาก และมีสีที่แตกต่างกันตามชนิดของต้น มีสีขาวม่วงขาวชมพูสีม่วงอมชมพูต่อมาเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเกือบขาวออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่งผลรูปรียาวประมาณ 2 เซนติเมตร



ผล : ผลจะออกเป็นช่อ รวมกัน คล้ายกับลูกหมากดิบผลแก่แตก เป็น 6 ซีก เมล็ดเล็ก มีปีกโค้งทางด้านบน 1 ปีก

เปลือก : เปลือกเรียบ เป็นมัน สีเทาอมขาว และมีรอยแผล เป็นหลุมตื้น ๆ ตลอดลำต้น

- 
- ออกดอก** : เดือนมีนาคม-เมษายน
- การขยายพันธุ์** : เป็นไม้ที่ชอบขึ้นตามป่าที่ราบ และกลางแจ้ง ขยายพันธุ์ด้วย การเพาะเมล็ด
- อื่น ๆ** : เป็นพรรณไม้ในเอเชียเขตร้อน ในทางวรรณคดี ในเรื่องรามเกียรติ์ ได้กล่าวถึงตะแบก
- ออกดอก** : กรกฎาคม - กันยายน ไม่นานจนแล้วแต่สภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดได้ประมาณเดือน ธันวาคมขึ้นไป ผลแก่ จะแตกเพื่อโปรยเมล็ดในราวเดือน มีนาคม
- ประโยชน์** : ไม้ละเอียดแข็ง ใจกลางมักเป็นโพรง ใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่รับน้ำหนักเสา กระดานพื้น และเครื่องมือการเกษตร และนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-002

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Bauhinia tomentosa*

ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE

ชื่อสามัญ : Pink Orchid Tree, One-stamened Bauhinia, Jerusalem Date Butterfly Flower

ชื่ออื่นๆ : โยทะกา

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 2-3 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ลำต้นตรงมีแตก กิ่งเป็นพุ่มเตี้ย



ใบ เป็นพืชใบใหญ่มีใบแผด ค่อนข้างใหญ่ไม่เขียวเข้ม ไม่แน่น แสงแดดผ่านได้



ดอก ดอกมีขนาดใหญ่ ออกเป็นช่อ สีดอกออกใหม่ ๆ จะมีสีเหลืองปนแดง อีก 4 กลีบด้านในเป็นสีขาว หรือสีชมพูจางๆ มีจุดแต้มสีแดง พอหลัง 2 วัน สีเหลือง สีแดงและสีขาว ก็จะกลายเป็นสีชมพูเข้ม เหลื่อมซ้อนกันคล้ายดวงโคมห้อยระย้าใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกและใบมีกลิ่นฉุน กลีบดอกร่วงง่าย

ผล : ผลมีรูปเป็นฝัก หนา ยาวประมาณ 15 ซม. พอเมล็ดแก่ ฝักจะแตกออกจากกัน

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : เป็นพรรณไม้ที่ทนความร้อนได้ดี


สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วน ความชื้นปานกลาง แสงปานกลาง

เวลาออกดอก : ตลอดปี

ถิ่นกำเนิด : ในภาคใต้ของไทย และแหลมมลายู

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะด้วยเมล็ด

ประโยชน์ : ปลูกทรงสวยงาม มีดอกตลอดปี โตเร็ว



ออกดอก

เอกสารอ้างอิง

: ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

: พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ
ในเมืองไทย

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-003

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Lagerstroemia loudonil*

ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ : Salao bai vai

ชื่ออื่น ๆ : เสาใบใหญ่

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ผลัดใบขนาดกลาง มีความสูง 10–20 เมตร เปลือกเป็นร่องรอยแตกเล็ก ๆ ไปตามความยาวของลำต้น เปลือกมีสีเทาเกือบดำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่น ทึบสีเขียวเข้ม กิ่งมักช้อยห้อยลง

ใบ : เป็นรูปยาวรี คล้ายหอก ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยตลอดทั้ง ใบจะมีขนสีเหลืองทองปกคลุมใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม แผ่นใบยาวแบบรูปขอบขนานกว้าง 6 - 10 เซนติเมตร ยาว 16 - 24 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ยาวเล็กน้อย โคนมน ผิวใบมีขนปุยอ่อนนุ่ม ทั้ง 2 ด้าน

ดอก : ดอกเป็นช่อ รูปทรงกระบอก ลักษณะกลีบดอกและกลีบรองดอกมีประมาณ 68 กลีบในหนึ่งดอก มีสีม่วงดอกสีม่วงสดเวลาดอกบานช่อดอกจะแน่นเป็นรูปทรงกระบอกก้านช่อดอกและกลีบรองกลีบดอกมีขนนุ่ม สีเหลืองปกคลุมทั่วไป กลีบดอกมักมี 6,7 หรือ 8 กลีบที่ผิวนอกของกลีบรองกลีบดอกรูปถ้วยเมื่อ บาน มีขนาดกว้าง 6.8 -8.2 เซนติเมตร

ผล : เกือบกลมผิวแข็ง ยาวประมาณ 1.5 - 2.1 เซนติเมตร ผลแห้งแตกตามยาว 5 - 6 พูเมล็ด จำนวนมาก มีปีก

เปลือก : สีเทาดำ มีรอยแตกกระแหว่งเป็นทางยาวตลอดลำต้น

ถิ่นกำเนิด : เอเชียเขตร้อน

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง


สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนซุย

เอกสารอ้างอิง : พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมพจนานุกรมไม้ดอกประดับในเมือง

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-004

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Cassia fistula</i> Linn.
ชื่อวงศ์	: CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ	: Golden Shower , Indian Laburnum
ชื่ออื่น ๆ	: ฦ๎น , ราชพฤกษ์
ลักษณะทั่วไป	



ต้น เป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ค่อยสูงนัก จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไป เพื่อชู ดอก ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร เรือนยอดรูปไข่หรือรูปร่ม ผลัดใบเปลือกสีน้ำตาล

ดอก : ออกดอกเป็นช่อ อยู่ตามก้านของลำต้น มีสีเหลือง ในขณะที่ดอก ใบบจะร่วง ออกดอกปีละครั้ง ดอกสีเหลืองสดออกเป็นช่อคล้ายหาง กระรอก ดอกขึ้นเป็นช่อยาว 20-40 เซนติเมตร แต่ละดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 เซนติเมตร มีกลีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากัน 5 กลีบ มีกลิ่นหอมออกเป็นช่อ 8-10 มิลลิเมตร แต่วางง่าย กลีบเลี้ยง รูปกระจะห้อยลงออกตามกิ่งยาว 20-40 เซนติเมตร แกนเกลี้ยงก้านดอกย่อยยาว 1.1-3.5 เซนติเมตร ใบประดับยาวรีแกมไข่ ยาว 7-10 มิลลิเมตร มีขนละเอียดด้านนอกส่วนด้านในเกลี้ยง

ผล : เป็นฝักยาวเมื่ออ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีดำ ภายในมีเมล็ดมากผล เป็นฝักรูปทรงกระบอกฝักแก่สีน้ำตาลเข้ม ผลยาว 30-62 เซนติเมตร และกว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นฉุน และมีเมล็ดที่มีพิษเป็นจำนวนมาก

ใบ ใบมีสีเขียวอ่อน ๆ ขอบใบเรียบไม่มีจัก โคนใบมน ปลายใบแหลม ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย เรียงตรงข้าม แผ่นใบย่อยรูปไข่ ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 34 เซนติเมตร

การออกใบ

: ราชพฤกษ์จะผลัดใบ จนหมดทั้งต้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนและจะผลิใบใหม่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

การออกดอก

: จะพร้อมกันทั้งต้นพร้อมกับการผลัดใบคือระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม

การออกผล

: จะเริ่มราวเดือนพฤษภาคม และจะผลแก่ราวเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ผลแก่จะห้อยติดอยู่กับต้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มร่วงราวเดือนเมษายน ไปเรื่อยๆจนหมดต้น ซึ่งเป็นเวลาพอดีกับฤดูกาลออกดอกรุ่นใหม่

ถิ่นกำเนิด

: ป่าเบญจพรรณ

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

: นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ทั่วไปเพราะ มีดอกสวยงาม

สถานที่ที่ชอบขึ้น

: ป่าเบญจพรรณ

เวลาออกดอก

: ก.พ. – พ.ค.

เวลาออกผล

: ก.พ. – พ.ค.

การขยายพันธุ์

: ตอนกิ่งชำ การเพาะเมล็ดวิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การเพาะเมล็ด

เอกสารอ้างอิง

: สมุนไพรรักษา ร.ศ.ดร.วันดี กุญชรพันธ์

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-005

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Jatropha integerrima* Linn.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ : Jatropha

ชื่ออื่น ๆ : ปัตตาเวีย

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง รูปทรงค่อนข้างโปร่ง ลำต้นสูง 5 ฟุต



ใบ : มีสีเขียว ใบใหญ่เป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบไม่มีจัก



ดอก : ดอกมีสีแดง หรือ ชมพู ออกดอกเป็นช่อ อยู่ตรงส่วนยอดของ ลำต้น ดอกหนึ่ง มี 5 กลีบ อยู่ได้นาน

ถิ่นกำเนิด : ถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณอินดีสตะวันออก

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ปานกลาง เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดด

สถานที่ที่ชอบขึ้น : มีความชื้นสม่ำเสมอ มีแสง

เวลาออกดอก : ตลอดปี

การขยายพันธุ์ : โดยการตอน และเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ปลูกร่วมกับไม้ประดับอื่น ๆ

เอกสารอ้างอิง : พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมพจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ ในเมืองไทย

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-006

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Wodyetia bifurcata</i> A.K.
ชื่อวงศ์	: PALMAE
ชื่อสามัญ	: Foxtail Palm
ชื่ออื่น ๆ	: ปาล์มหางหมาป่าปาล์มหางกระรอก
ลักษณะทั่วไป	



ต้น รูปทรงปาล์มความสูง 10 – 15 เมตร เป็นไม้ทรงพุ่ม ลำต้นสีน้ำตาลผิวเรียบเห็นข้อปล้องชัดเจน ต้นจะอ้วนกว่าปรงตรงกลางหน่อยๆ

ใบ สีเขียวเป็นใบประกอบแฉกมากเรียงเป็นวงพุ่ม ไม้ผลัดใบ ใบย่อยจะเป็นพวงแผ่ออกทุกทิศทาง ใบมีอยู่สองลักษณะคือใบแคบแหลมและใบกว้างปลายใบหยัก และใบค่อนข้างแข็ง



ถิ่นกำเนิด	: ออสเตรเลีย
การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย	: ปานกลาง
สถานที่ที่ชอบขึ้น	: ดินร่วน ความชื้นปานกลาง
การขยายพันธุ์	: ใช้เมล็ด
ประโยชน์	: ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ
เอกสารอ้างอิง	: พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม



ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-007

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Graptophyllum pictum* Linn. Griff

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ :

ชื่ออื่น ๆ : นากชมพู

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีแตกกิ่งก้านสาขาออกมาตรงโคนต้นลำต้นสูง 1 – 2 ฟุตลำต้นมักเปราะบางหักง่าย มีความสูงไม่เกิน 2 เมตร ชอบแสงมาก ชอบปานกลาง



ใบ ลักษณะใบเป็นรูปหอก ปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ พื้นใบสีม่วง อมเขียว มีรอยด่างเป็นสีขาวและสีม่วงมีใบคู่ตรงกันข้าม ใบมักมีสีสันสวยงาม ใบของต้นใบนากเป็นรูปหอก ปลายแหลม พื้นใบมีสีเขียว อมม่วง ขอบใบเป็นสีชมพู

ดอก : มีสีม่วงแก่ดอกจะมีลักษณะเป็นหลอด ปลายหลอดจะแยกเป็น 5 กลีบมักออกปลายยอด มีเกสรตัวผู้ยื่นออกมา ออกดอกสีม่วงตลอดทั้งปี เชื่อว่าใบนากจะทำให้เจ้าบ้านมีเงินมีทอง บ่งถึงความร่ำรวย

สถานที่ที่ชอบขึ้น : เป็นไม้ในร่มรำไร

การขยายพันธุ์ : การปักชำ การเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับสวน ไม้กระถางมีลักษณะเด่นสะดุดตา อยู่ที่ใบ เป็นไม้มงคล นิยมปลูกในบ้าน ใช้ในพิธีมงคลสมรสแบบไทย

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-008

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Wrightia religiosa* Benth.

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ชื่ออื่น ๆ : โมก

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 15 ฟุต เปลือกของลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลดำ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-12 เมตร ผิวเปลือกสีน้ำตาลดำ ลำต้นกลมเรียบมีจุดเล็ก ๆ สีขาวประทั่วต้นแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบลำต้นไม่เป็นระเบียบ และมีจุดเล็ก ๆ สีขาวประทั่วต้น



ใบ : เป็นใบเดี่ยว จะออกเรียงกันเป็นคู่ไปตามก้านใบ ใบจะเป็นรูปหอกกว้าง ลักษณะใบเป็นรูปไข่รี ปลายใบมนแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบบางสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร 2.5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตรขอบใบขนาน ใบสีเขียวใบดกออกเป็นพุ่ม

ดอก : ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ตรงปลายกิ่ง ช่อ ๆ หนึ่งมีดอกประมาณ 5-7 ดอก ดอกเล็กสีขาวกลิ่นหอมมี 5 กลีบในหนึ่งดอกอยู่ตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอก 4-8 ดอก ลักษณะดอกจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดินมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวกลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่มีขนาด ประมาณ 2 เซนติเมตร

ผล : เป็นฝักยาว 15 เซนติเมตร พอแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดมากผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกจะออกมาเป็นคู่ ลักษณะโค้งงอเข้าหากัน ภายในมีเมล็ดเรียงอยู่เป็นจำนวนมาก ขนาดความยาวของฝักประมาณ 10-15 เซนติเมตร

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ปลูกขึ้นได้ดีทุกชนิด

เวลาออกดอก : ออกดอกตลอดปี สีขาว กลิ่นหอม

การขยายพันธุ์ : การตอน การเพาะเมล็ด



ประโยชน์ : ปลุกประดับอาคารทั่วไป รากโมกใช้เป็นสมุนไพร นำมาใช้เป็นส่วน ผสมเป็นยา
แก้โรคผิวหนัง

เอกสารอ้างอิง : หนังสือดอกไม้หน้าปลูก

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-009

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ficus microcarpa* Linn.

ชื่อวงศ์ : MORACEAE

ชื่อสามัญ : Golden Leaf

ชื่ออื่น ๆ : ไทรยอดทอง

ลักษณะทั่วไป



ต้น ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10 – 15 เมตร ใบออกหนา ทำให้ทรงพุ่มหนาทึบ ลักษณะกิ่งค่อนข้างแข็ง มีรากอากาศ ออกดอกตามลำต้นได้เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก



ใบ ใบรีรูปไข่ปลายใบแหลม ใบที่อยู่ด้านล่างจะมีสีเขียวเข้ม ส่วนใบที่อยู่ด้านบนจะมีสีเหลืองทอง ใบหนาค่อนข้างแข็ง ใบออกหนาแน่น ทำให้ทรงพุ่มหนาทึบ ลักษณะกิ่ง ค่อนข้างแข็ง มีรากอากาศ ออกดอกตามลำต้น ใบรีรูปไข่ ปลายใบแหลม ใบอยู่ด้านล่างจะมี สีเขียวเข้ม ส่วนใบที่อยู่ตามส่วนบนและปลายยอดมีสีเหลืองทอง ใบหนาค่อนข้างแข็งใบมีขนาดเล็ก 5-10 เซนติเมตร ใบหนาเป็นมัน รูปไข่กลับ โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีเหลือง ใบแก่สีเขียวเข้ม

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ชอบแสงแดดจัด

การขยายพันธุ์ : การตอน การปักชำ

การกระจายพันธุ์ : ชอบขึ้นในที่แจ้ง

ประโยชน์ : ไทรยอดทองเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางและปลูกประดับสวนหรือประดับน้ำตก หรือปลูกตามชานน้ำ ใช้ตกแต่งสถานที่

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-010

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ixora hybrid*
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่อสามัญ : เข็มพิษณุโลก
ชื่ออื่น ๆ : เข็มชมพู
ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก และอาจถึงขนาดย่อม ลำต้นจะสูงประมาณ 3 - 5 ฟุต จะแตกกิ่งก้านสาขาออกแผ่เป็นพุ่ม



ใบ : ใบของดอกเข็มจะแข็ง และเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณะของใบมนรี ปลายใบแหลม โคนใบจะมน ใบจะออกเรียงสลับกันคนละทิศทาง



ดอก : ดอกจะออกเป็นช่อใหญ่ จะออกตรงส่วนยอดของต้นในแต่ละช่อนั้นจะประกอบด้วยดอกขนาดเล็กๆ เป็นหลอดตรงปลายหลอดจะเป็นกลีบซึ่งมีอยู่ 4 - 5 กลีบ ปลายกลีบจะแหลม

ถิ่นกำเนิด : ประเทศศรีลังกา พม่า
การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : โดยการปักชำ
สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง แดดเต็มวัน
เวลาออกดอก : ตลอดทั้งปี
เวลาออกผล : -
การขยายพันธุ์ : การตอนและปักชำ
ประโยชน์ : ใช้ทำรั้ว เหมาะแก่การปลูกสวนหย่อมเพราะโตช้า

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-

เอกสารอ้างอิง

: พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ถิ่นกำเนิด

: ประเทศศรีลังกา พม่า ไทย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

: โดยการปักชำ

เวลาออกดอก

: ตลอดทั้งปี

การขยายพันธุ์

: การตอนและปักชำ

ประโยชน์

: ใช้ทำรั้ว เหมาะแก่การปลูกสวนหย่อมเพราะโตช้า เป็นไม้

ประดับ สวนหย่อม นิยมปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นไม้กระถาง

เอกสารอ้างอิง

: พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-011

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Lagerstroemia indica* L.

ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ : Grape Myrtle

ชื่ออื่น ๆ : ยี่เข่ง คำช่อ

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดกลาง ลำต้นสูงโปร่ง มีความสูง 20 – 50 ฟุต ต้นแตกกอ แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ต้น ผิวต้นสีเทาเกือบขาว เรียบ ลอกได้เป็นแผ่นบางๆ กิ่งก้านอ่อน มีปีกแคบๆ ดูเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ต้นสูงประมาณ 7 เมตร

ใบ ออกใบตามปลายกิ่ง ส่วนยอด หรือตามข้อของลำต้นออกเป็นคู่ ลักษณะใบจะกลมรี ยาวประมาณ 2 นิ้วใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามเรียงเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น แต่ใบที่อยู่ตรงส่วนยอดของต้นจะออกสลับกัน ใบเป็นรูปไข่ โคนใบมน ปลายมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบและมัน ท้องใบตรง เส้นกลางใบมีขนสั้นๆ ปกคลุมเล็กน้อย ใบกว้าง 2-4 ซม. ยาว 2.5- 7 ซม. สีเขียว ใบแทบจะไม่มีก้านใบเลย

ดอก : ดอกมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ลักษณะดอกเป็นช่อ กลีบดอกมันบางย่น หยิกกว้าง ดอกหนึ่งมี 6 กลีบ ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้สีเหลือง ดอกช่อหนึ่งยาว 18 เซนติเมตร ดอกจะบานทั้งต้นดอกช่อ

ออกเป็นช่ออยู่ที่ยอดของต้น ส่วนล่างของดอกเป็นเส้นกลมเล็กๆ ส่วนบนบานแผ่ออกเป็นกลีบกลม ขอบหยิก มีรอยยับย่น 6 กลีบ สีม่วง หรือชมพู ขาว แดงแก่ แดงอ่อน แดงดำ เกสรกลางดอกปลายเป็นตุ้มสีเหลือง ดอกบานเต็มที่ประมาณ 4 ซม. ดอกเล็กกว่าดอกลั่นทมเล็กน้อย มีทั้งดอกซ้อนและดอกกลาดอกซ้อนกลีบหอมเย็น

ผล : ผลแห้งแตก รูปถ้วย เปลือกแข็ง มีเมล็ดจำนวนมาก

ถิ่นกำเนิด : บางพวกเชื่อว่าอยู่ในอินเดีย, มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย, บางพวกบอกจีน จีน เป็นผู้นำเข้าตอนปลายรัชกาลที่ 3 เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุย ทนแล้ง น้ำกร่อย น้ำเค็มได้



สถานที่ที่ขอขึ้น : เป็นไม้กลางแจ้งไม่ชอบดินแฉะหรือในที่ลุ่มมีน้ำขัง
การขยายพันธุ์ : ใช้วิธีปักชำหรือตอนกิ่ง
เอกสารอ้างอิง : พันธุ์ไม้งาม (อร่ามสวนหลวง ร. 9)

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-012

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Bougainvillea* spp.

ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE

ชื่อสามัญ : Bougainvillea

ชื่ออื่น ๆ : เฟื่องฟ้า

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นไม้เถาเลื้อย มีลำต้นแข็งแรง ตามเถาจะมีหนามแหลมอยู่เป็นระยะๆ สามารถเลื้อยเถาได้ไกล ตัดแต่งเป็นพุ่มได้

ไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทเถาเลื้อย ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-10 เมตร มีลำเถาแข็งแรงเลื้อยไปได้ไกล ผิวลำต้นสีเทาหรือสีน้ำตาล ลำต้นมีหนามคมแหลมยาวประมาณ 0.51 เซนติเมตรติดอยู่เป็นระยะๆ

ลักษณะของทรงพุ่มสามารถตัดแต่ง และบังคับทิศทาง การเจริญเติบโตได้

ใบ : ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบเรียบไม่มีจัก ใบมีสีเขียวสด บางชนิดมีใบเป็นรูปหัวใจใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถา ลักษณะรูปไข่ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบเรียบพื้นใบเรียบสีเขียว ขนาดใบกว้าง 2 - 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร

ดอก : ดอกที่เราเห็นทั่วๆ ไปที่จริงเป็นใบประดับจะมีหลายสี บางชนิดอาจมีสอง สี ใบประดับจะแตกออกเป็นช่อใหญ่อยู่ตามส่วนยอดของต้นมี 3 ใบ ส่วนดอกที่แท้จริงอยู่ตรงกลางของใบประดับรูปรางเหมือนแจกันเล็กๆ ตั้งอยู่บนยอด ขอบแฉกสีขาวอมเขียวเป็นจักๆ มีดอกคกมากจะผลิดดอกตรง ต่อเวลาดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอด มีกลีบดอกหรือใบประดับ 3 กลีบ ส่วนดอกจะมีดอกเล็กสีขาว กลีบดอกจะมีขนาดและสีสรรแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์

ถิ่นกำเนิด : บราซิล

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนซุย ชอบความชุ่มชื้น ชอบอยู่กลางแจ้ง

การขยายพันธุ์ : การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-013

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Millingtonia hortensis* Linn.

ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ : Cork Tree

ชื่ออื่น ๆ : ปีป , กาสะลอง

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขามักจะทอดลงลำต้นสูง 25 เมตร เปลือกหนา สีขาวอมเทาและจะแตกเป็นร่อง

ใบ : เป็นไม้ใบผสม ออกใบเป็นช่อ ๆ แผ่กระจาย มีใบย่อยเล็ก ๆ อยู่ใบย่อยเป็นรูปไข่ ขอบใบเรียบ โคนใบมนปลายใบแหลมเป็นติ่งยาว ใบกว้าง 1 – 2 นิ้ว สีเขียวเป็นช่อแต่ละช่อประกอบด้วยใบเล็ก ๆ รูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปหอกหลายใบ ขนาดกว้าง 2-3 ซม. ยาว 4-8 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบหยักมน หรือว่าเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบอ่อนมักจะมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมที่บริเวณท้องใบ

ดอก : ออกดอกเป็นช่อแผ่กระจายอยู่ตามปลายกิ่ง ตัวดอกจะห้อยย้อยลักษณะ ดอกเป็นรูปกรวยยาว 2 นิ้ว ตรงปลายดอกแยกเป็น 5 แฉก จะบานเวลากลางคืนมีกลิ่นหอม ตอนเช้าดอกมักจะร่วงออกเป็นช่อโต ๆ

ตามปลายกิ่ง แตกกิ่งก้านแผ่กว้าง ดอกสีขาวกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกมีขนาดประมาณ 15x25 ซม. กลีบรองกลีบดอกมีขนาดเล็กมาก โคนเชื่อมติดกันยาว 2-4 มม. ปลายแยก เป็นกลีบกลม ๆ 5 กลีบ ขอบมีขนออกกลีบดอกยาวประมาณ 4.5-7 ซม. กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อเล็กยาว ท่อมีขนาดกว้างประมาณ 2 มม. ยาว 6-8 ซม. ปลายท่อบานออก แยกออกเป็น 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เกสรตัวผู้ชูอับเรณูยื่นออกมาจากปากท่อกลีบดอกเล็กน้อย มีจำนวน 4 อัน ยาว 2 อัน สั้น 2 อัน ติด อยู่ด้านในใกล้ปากท่อดอก ยาว 10-14 มม. อับเรณูมีช่องเดียว ส่วนที่โคนมีจะงอยเล็ก ๆ ติดอยู่ เกสรตัวเมียมี 1 อัน ท่อเกสรยาวถึง 8 ซม.

ผล

: เป็นฝักแบน ทั้งปลายและโคนจะแหลม และจะมีปีกบาง ๆ ซึ่งสามารถปลิวไปได้ไกลเป็นฝักแบน ตรง หัวแหลมท้ายแหลม มีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2.3 ซม. ยาว 25-30 ซม. เมล็ดแบนสีขาวมีเป็นจำนวนมาก เมล็ดมีปีกบาง ๆ ทำให้สามารถปลิวไปตามลมได้ไกลๆ ขนาดของเมล็ดรวมทั้งปีกประมาณ 1.3x2.3 ซม

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ป่าเบญจพรรณ

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ในป่าเบญจพรรณ

การขยายพันธุ์ : ชำหน่อที่เจริญจากราก เพาะเมล็ด

ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับเปลือกใช้ทำจุกหวด ดอกแห้งผสมยาสูบใช้มวนบุหรี่

เอกสารอ้างอิง : บางกอกกอล์ฟคลับพรรณไม้

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-014

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Hymenocallis littoralis variegata*

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ชื่อสามัญ : Star Lily

ชื่ออื่น ๆ : รวงทอง

ลักษณะทั่วไป



ต้น ไม้กอขนาดเล็ก ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน กาบใบห่อหุ้มรวมกัน ลักษณะเหมือนลำ ต้นสั้นๆ ชูขึ้นเหนือพื้นดิน ลำต้นมีข้อปล้องสั้น ๆ อัดตัวกันแน่นเป็นแผ่น



ใบ ใบหนาแคบเรียวยาว ปลายใบมน พื้นใบสีเขียวด่างสีเหลืองเป็นแถบใหญ่ริมใบทั้งสองข้างตามความยาว เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเรียวยาวมีเส้นกลางใบเรียงขนาดตามความยาวจำนวนใบเฉลี่ยต่อต้น 3-10 ใบใบเจริญมาจากตามยอด ใบยาว อวบน้ำ สีเขียวสด ดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาวตรงและแข็งแรง กลวงตรงกลาง



ดอก ดอกเป็นช่อสีขาว

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : เมื่อมีอายุมากจนเกินไปจะเกิดเป็นหัวใหม่

สถานที่ที่พบขึ้น : แสงแดดรำไร

การขยายพันธุ์ : การแยกหัว , การแบ่งหัว

ประโยชน์ : ห่วงนำมาใช้ปลูกในสวนทุกชนิด ผสมเหล่าทิวบริเวณที่ปิดเมื่อปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อประดับใช้ได้ทั้งประดับในอาคาร และนอกอาคาร

เอกสารอ้างอิง : สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-015

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Cleyera japonica*

ชื่อวงศ์ : MORACEAE

ชื่อสามัญ : Gogen fig.

ชื่ออื่น ๆ : ไทรใบด่าง

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ลำต้นตรง ปลูกในกระถางจะแตกกิ่งไม่มาก สูง 2-3 ฟุตเป็นไม้ต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 20 เมตร รัดพันไม้อื่น มียางสีครีม หรือสีเหลืองอ่อน ลำต้นมีสีเทาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-20 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มหนา ทึบ ผิวเปลือกเรียบสีเทาปนเทา ตามกิ่งก้านมีรากอากาศ แตกห้อยย้อยลงสู่พื้นดินเป็นจำนวนมาก โคนต้นเป็นพุ่มพอง



ใบ : เป็นไม้ที่มีใบสวย ลักษณะของใบปลายจะแหลม และโคนใบก็แหลมเข้าหาก้านใบ พื้นใบสีเขียว ตรงริมขอบใบมีสีเหลืองทองใบแก่เหนียว เรียบเกลี้ยง ก้านใบมีรากเล็กน้อย กิ่งก้านเรียวเล็ก ใบเป็นรูปไข่ มีสีเขียวแกมเหลืองหรือเหลืองออกขาว ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกจากกิ่งและส่วนยอดของลำต้น ใบออกเป็นคู่สลับกัน เป็นไม้ประดับที่มีใบสวย ใบมีสีเขียว บางชนิดเป็นใบด่างพื้นใบเป็นสีเขียวริมขอบใบจะมีสีเหลืองหรือสีชมพูเรื่อ ๆ ปลายใบแหลม โคนใบแหลมสอบ



ดอก : จะมีสีครีมออกเหลือง จะออกดอกก็ต่อเมื่อต้นไม้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

ผล : ลักษณะของผลค่อนข้างกลม มีขนาดโตเท่ากับผลมะแว้ง ผลเมื่อสุกหรือแก่เต็มที่จะเป็นสีแดงสดหรือสีเหลือง ออกผลเป็นคู่ ไม่มีก้านผลเมล็ดค่อนข้างกลมออกแบบมะเดื่อ ออกเดี่ยวหรือคู่



ลักษณะวิสัย	: ไม้ต้น
ประโยชน์	: เป็นไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด	: ในทวีปเอเชีย แอฟริกา อินเดีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น
สถานที่ที่ขึ้น	: มีความชื้นพอดี
เวลาออกดอก	: จะออกดอกเมื่อได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
การขยายพันธุ์	: ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำพาดกิ่ง แยกต้น การตอนกิ่ง
เอกสารอ้างอิง	: พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย พิมพ์ครั้งที่ 3

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-016

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ficus benjamina* L. Var. variegated

ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE

ชื่อสามัญ : Cannon-ball Tree

ชื่ออื่น ๆ : สาละ

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ซึ่งมีความสูงประมาณ 80 ฟุต ผิวเปลือกของลำต้นขรุขระตกละเอียดเป็นร่อง เปลือกของ มันมีสีน้ำตาล เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาแตกเป็นร่อง เป็นสะเก็ดทั่วไป เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ปลายกิ่งมักจะงุ้มลง กิ่งอ่อนเกลี้ยงไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ หนาทึบ เปลือกสีน้ำตาลแกมเทา แตกเป็นร่องและสะเก็ด

ใบ : ลักษณะของใบยาวรี มีความกว้างประมาณ 10 ซม. ยาวประมาณ 23 ซม. ใบเดี่ยวคดหนาทึบ รูปไข่กว้าง โคนใบเว้าเข้า ปลายใบเป็นคิงแหลมสั้น ๆ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปขอบขนานถึงรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 12-25 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบหรือมน ขอบใบจักตื้น ใบหนา

ดอก : ดอกมีสีแดง และชมพูอมเหลือง ลักษณะของดอกใหญ่มีอยู่ 6 กลีบ กลีบของมันค่อนข้างแข็ง ดอกตูมจะเป็นสีเหลืองดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามปลายกิ่งและง่ามใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอม ด้านในสีม่วงอ่อนอมชมพู มีกลิ่นหอมมาก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกขนาดใหญ่ตามลำต้น ช่อดอกยาว 30-150 เซนติเมตร ปลายช่อโน้มลง กลีบดอกหนา 4-6 กลีบ กลางดอกนูน สีขนสั้นสีเหลืองคล้ายแปรง เกสรเพศผู้เป็นเส้นยาวสีชมพูแกมเหลือง จำนวน

ผล	: เป็นผลชนิดแห้ง แข็ง มีปีก 5 ปีก ปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก บน แต่ละปีกมีเส้นตามความยาวของปีก 10 - 15 เส้น ผลแห้ง ทรงกลมใหญ่ ขนาด 10-20 เซนติเมตร เปลือกแข็ง สีน้ำตาลปนแดง ผลสุกมีกลิ่นเหม็น มีเมล็ดจำนวนมาก รูปไข่
ฤดูที่ดอกบาน	: เกือบตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต	: ปานกลาง
ถิ่นกำเนิด	: ทางเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งปัจจุบันคือประเทศเนปาล หมู่เกาะแคริบเบียน อเมริกาใต้
สถานที่ที่ชอบขึ้น	: เป็นไม้กลางแจ้ง
การขยายพันธุ์	: เพาะเมล็ดได้ผลดี ถ้าใช้ทาบกิ่ง ตอนกิ่ง ติดตา จะได้ผลน้อยมาก
ความชื้น	: ปานกลาง
ประโยชน์	: เนื้อไม้ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ใช้ทำรูป ทางยา ยางต้นใช้เป็นยาฝาดสมาน
เอกสารอ้างอิง	: หนังสือชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-017

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Alstonia scholaris* (L.) R.Br.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ : Devil Tree, Parl - mari, Dita Bark
ชื่ออื่น ๆ : สัตตบรรณ

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ลำต้นสูงประมาณ 15 – 25 เมตร มีเนื้อไม้ค่อนข้างเหนียวและทนทานมาก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ โตเร็ว ลำต้นตรง สูงราว 15-30 เมตร ผิวลำต้นมีสะเก็ดเล็กๆ สีขาวปนน้ำตาล เปลือกสีเทา มียาง สีขาว เนื้อไม้สีขาวอมเหลือง แตกกิ่งก้านสาขามากตามยอด




ใบ : ใบมีสีเขียวเข้ม ลักษณะใบมนรี ปลายมนโคนใบแหลมออกเป็นกลุ่มรอบ ๆ กิ่ง กลุ่มละ 7 ใบ ขนาดใบยาว 12 – 15 ซม. มีก้านใบสั้นใบเป็นใบเดี่ยวมนรี ปลายใบมน โคนใบแหลมก้านใบสั้น แดงใบออกรอบข้อเป็นวง เรียงกันคล้ายดินเป็ด จึงมักเรียกกันทั่วไปว่า “ดินดินเป็ด”



ดอก : ออกดอกเป็นช่อออกตามยอดหรือตามปลายกิ่งลักษณะคล้ายดอกเข็มคือเป็น กลุ่ม ๆ ช่อหนึ่งมีดอก 7 กลุ่มบานพร้อมกันสีขาวอมเหลือง ดอกของสัตตบรรณ มีขนาดเล็ก สีขาวอมเขียว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ช้อนกันเหมือนฉัตรประมาณ 2-3 ชั้น ช่อหนึ่งๆ จะติดกลุ่มเป็นพุ่มย่อยๆ ช่อละ 7 พุ่มเหมือนกันทุกช่อ มักจะบานพร้อมกัน

ผล : เป็นฝักยาว ๆ มีเมล็ดเล็ก ๆ ติดปูยปลิวไปตามลมได้ไกลผลเป็นฝักกลมยาว เมื่อแก่จัดจะแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดซึ่งมีขนยาวอ่อนนุ่มปกคลุมติดอยู่เป็นกระจุกที่ปลายทั้งสองข้าง จะปลิวกระจายไปตามลม



ลักษณะวิสัย	: ไม้ต้น
ถิ่นกำเนิด	:
การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย	: เป็นไม้กลางแจ้ง ปลูกง่าย ไม่เลือกดิน
สถานที่ที่ชอบขึ้น	: ขึ้นได้โดยทั่วไป
เวลาออกดอก	: พฤศจิกายน-มกราคม
เวลาออกผล	: เดือนตุลาคม-ธันวาคม
การขยายพันธุ์	: โดยการปักชำ การเพาะเมล็ด
ประโยชน์	: ใช้ในการก่อสร้างทำเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หีบใส่ของ ลูกทูนวน ของเล่นเด็ก มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาก ให้ร่มเงา และไม่ประดับ ในการจัดสวน
เอกสารอ้างอิง	: หนังสือไม้ดอกหอม เล่ม 2 (สำนักพิมพ์บ้านและสวน)

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-019

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ixora lobbii* Loud

ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE

ชื่อสามัญ : West Lidian Jasmine

ชื่ออื่น ๆ : เข็ม, เข็มแดง

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก เตี้ย ลำต้นสูงประมาณ 12 ฟุต

ใบ : เป็นเข็มที่มีลำต้นและใบเล็ก ใบสีเขียวเข้ม ลักษณะของใบรูปใบจะมนเล็ก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบเกลี้ยง



ดอก : ออกดอกเป็นช่อ จะออกตามส่วนยอดของก้าน ลักษณะของดอกเป็นแฉกกว้าง มีสีแดงสด ดอกจะดอกออกดอกตลอดปี



ถิ่นกำเนิด :

บริเวณที่พบ : สวนป่า, สวนธรรม

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนซุย ขึ้น

เวลาออกดอก : ตลอดปี

การขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง

ประโยชน์ : ใช้ทำรั้วหน้าบ้าน ในทางสมุนไพร รากมีรสหวาน แก้โรคตาเจริญอาหารใบใช้ฆ่าพยาธิ ดอกแก้โรคตาแดง

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

เอกสารอ้างอิง : สารนุกรมพืชและสัตว์

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-020

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Spondias pinnata* (L.f.) Kurz

ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEA

ชื่อสามัญ : Hog Plum

ชื่ออื่น ๆ : มะกอก

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ลำต้นเปล่าและตรง แตกกิ่งก้านสาขาตรงเรือนยอดมีลักษณะกลมและโปร่ง เปลือกสีเทาเรียบ สูง 15-30 เมตรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ สูงประมาณ 15-20 เมตร ลำต้นตั้งตรง เนื้อไม้แข็ง กิ่งแขนงแตกเป็นพุ่มทรงกลมกว้าง กิ่งก้านมีร่องอากาศกระจายระจายทั่วไป ลำต้นมีสีเงินขาง

ใบ : จะออกเป็นคู่ ๆ รวมกันเป็นช่อ ใบคู่ ๆ หนึ่งตรงโคนใบก้านช่อจะมีขนาดเล็กกว่าใบตรงส่วนปลาย โคนใบจะเบี้ยว ปลายใบจะขอบเป็นติ่งยาวๆ เนื้อใบหนาและเกลี้ยงมีสีเขียว ใบกว้างประมาณ 2 นิ้ว ยาว 3-5 นิ้วเป็นใบประกอบรูปขนนกออกเรียงสลับ มีใบย่อย 9-13 ใบ เป็นรูปวงรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 7-12 ซม. ใบย่อย บริเวณโคนต้นฐานใบจะเรียว ใบอ่อนเป็นสีน้ำตาลแดงอมเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบแข็งแหลม และมีสีเขียว ปากใบอยู่ทางด้านหลังของใบ

ดอก : ออกเป็นช่ออยู่ตามง่ามใบหรือเหนือตอมไปตามปลายกิ่ง ดอกสีขาวมีอยู่ 5 กลีบเกสร 10 อัน เป็นดอกสมบูรณ์เพศเป็นสีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง หรือช่อใบของกิ่งที่ใบร่วง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดเล็กดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลม บริเวณใจกลางดอกมีเกสรตัวผู้สีเหลืองเป็นกระจุก ดอกสีขาวเล็ก มีสีกลีบ ช่อดอกหนึ่งช่อมีดอกตั้งแต่ 11-23 ดอก เกสรดอกมีสีเหลือง

ผล : เป็นรูปไข่ ตามผลจะมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่ ผลมีรสเปรี้ยวเป็นผลกลมรี ผลแก่สุกเป็นสีเขียวอมน้ำตาล มีเนื้อในลำนน้ำ รสเปรี้ยวอมหวาน ภายในมี 1 เมล็ด เวลาติดผลเป็นพวงห้อย ผลมะกอกมีทั้งรูปร่างกลมและรูปไข่ ผิวมะกอกบางชนิดเกลี้ยง บางชนิด ขรุขระ แต่ข้างในของทุกผลจะเมล็ดแข็ง เมื่อผลสุกสีผลจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นดำ

ถิ่นกำเนิด

:

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : พบตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณชื้น

สถานที่ที่ชอบขึ้น

: ในเขตร้อนซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง

การขยายพันธุ์

: โดยการเพาะเมล็ด

ประโยชน์

: ใบ คั้นเอาน้ำหยอดหู แก้ปวดหู แก้หูอักเสบ

เปลือกต้น ดับพิษกาฬ แก้ร้อนใน แก้ท้องเสีย แก้ปวดมวน แก้
สะอึก และแก้อาเจียน

ผล แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ธาตุพิการ แก้บิด แก้โรค ขาด

แคลเซียม ทำให้ชุ่มคอและแก้กระหายน้ำ

เมล็ด รสเย็น สุมไฟแช่เอาน้ำดื่มแก้ร้อนใน แก้หอบ และแก้สะอึก

ราก แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ทำให้ชุ่มคอ และขับปัสสาวะ

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-021

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Nelumbo nucifera* Gaertn.

ชื่อวงศ์ : NELUMBONACEAE

ชื่อสามัญ : Sacred Lotus

ชื่ออื่น ๆ : บัวหลวง

ลักษณะทั่วไป



ต้น บัวหลวงเป็นไม้น้ำและไม้ล้มลุกหลายฤดู มีเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน พังทัวอยู่ในโคลนเลน

ใบ ใบเป็นเดี่ยว รีวงสลับ แผ่นใบเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-50 ซม. ก้าน ใบแข็ง มีหนามเล็ก ๆ เมื่อหักเป็นสายใยและมีน้ำยางขาว

ดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยวมีสีขาวและสีชมพู ก้านดอกแข็งมีหนามเล็ก ๆ ชูเหนือน้ำ กลีบดอกจำนวนมาก เรียงซ้อนกันหลายชั้น ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เมื่อดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-25 ซม. ดอกมีหลายรูปทรงและมีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู แล้วแต่พันธุ์

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-022

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Acalypha Spp.</i>
ชื่อวงศ์	: EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ	: Copper Leaf
ชื่ออื่น ๆ	: หูปลาซ่อน
ลักษณะทั่วไป	



ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก ถึงกลาง ลำต้นสีน้ำตาลเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงประมาณ 2 เมตร เป็นพรรณไม้ล้มลุกมีลำต้นตั้งตรง มีความสูงประมาณ 4 - 18 นิ้ว ลำต้นปกคลุมด้วยขนนุ่มทั่วไป

ใบ ใบมีรูปร่างหลายแบบทั้งแบบเรียวยาว รูปหัวใจ ใบกลม หรือพับเป็นจีบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย พื้นใบสีเขียวขลิบขาว ชมพูอ่อน น้ำตาลแดง ขาว หรือ กัน ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีสีต่างกันใบรูปไข่ มีสีเหลืองและเขียว หรือสีนากปนเขียวใบซ้อนเรียงสลับกัน ชอบแสงปานกลาง - มาก ชอบความชื้นปานกลางใบมีลักษณะหุ้มห่อลำต้น ปลายใบแหลมเรียว โคนใบกว้างเป็นรูปไข่ ริมขอบใบหยักเว้า หลังใบมี สีเขียวเข้มได้ท้องใบมีสีม่วงแดง

ดอก ออกดอกปลายยอดนิยมตัดแต่งเป็นรูปทรงกลม เพราะปกติมีเรณูยอดไม่แน่นอน จัดเป็นไม้กลางแจ้งดอก ออกดอกเป็นช่อ ตามบริเวณกลางลำต้น ช่อหนึ่งจะแยกออกเป็น 2 แฉก ลักษณะของดอกเล็ก กลีบดอกส่วนใหญ่จะเชื่อมติดกันเป็นรูปท้อ ดอกมีสีแดงเป็นดอกสมบูรณ์เพศ

ลักษณะวิสัย	: ไม้พุ่ม
เวลาออกดอก	: ตลอดทั้งปี
อัตราการเจริญเติบโต	: เร็ว
ลักษณะนิสัย	: ขึ้นได้ในดินทั่วไป
ความชื้น	: ปานกลาง-สูง
แสง	: แดดเต็มวัน-ปานกลาง
การขยายพันธุ์	: โดยการปักชำ

ประโยชน์

- เมื่อโตมากๆแล้วทำการตัดแต่ง โคนจะโค้งไม่สวยงาม ไม่ควรตัดต่ำกว่า 1 เมตร
- นิยมปลูกทำเป็นรั้ว
- นิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวนหย่อม
- สรรพคุณทางยา ใช้ลำต้นสด แห้ง นำมาต้มน้ำกินเป็นยาแก้เจ็บคอ ต่อมทอมซิลอักเสบ
รากใช้ราดสดนึ่งกับเนื้อหมูแดงให้เด็กกินแก้โรคตานขางขโมย
- ใบมีสรรพคุณใช้คั้นหยอดแก้เจ็บตา แก้เจ็บหู ดอกใช้สมานแผล ห้ามเลือด

เอกสารอ้างอิง

: ไม้ดอกไม้ประดับ ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-023

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Carissa graneislor* A.O.C. form “Boxwood Beauty”

ชื่อวงศ์ : APOCYMACEAE

ชื่อสามัญ : Box wood Beauty, Natal plun

ชื่ออื่น ๆ : นาดัด, พลัม, หีบไม้งาม

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นเดี่ยว แตกกิ่งก้านสาขามากมายจนทำให้ดูเป็นพุ่มหนาทึบ ตามลำต้นมีหนามเล็ก ๆ สั้นแต่ไม่แข็งขึ้นอยู่ตามข้อ ลำต้นสูง ประมาณ 30 – 50 ซม. เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กในวงศ์ตีนเป็ดที่สูงถึง 2 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามปลายแหลมแยกเป็น 2 แฉก ยาวได้ถึง 3 ซม. ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางขาว ด้วยทรงพุ่มสวยจึงใช้ปลูกในสวนหย่อมทำเป็นรั้ว



ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยวลักษณะของใบเป็นรูปมนไข่ป้อม ปลายใบเป็นหนามแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบไม่มีจัก ใบสีเขียวเป็นมันเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันถี่ ใบรูปไข่ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 4-6.5 ซม. ปลายใบมนมีติ่งหนามสั้น โคนใบรูปหัวใจหรือตัด ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา แข็ง ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสีเขียวอ่อน



ดอก : ออกดอกเป็นดอกเดี่ยว บางทีออก 2 – 3 ดอกมีสีขาว ดอกจะเป็นรูปกลม ๆ เล็ก มี 5 กลีบ ออกดอกตรงส่วนยอด ดอกมีกลิ่นหอมออกเป็นดอกเดี่ยว แต่รวมกันเป็นช่อกระจุกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ช่อละ 1-3 ดอก สีขาว กลิ่นหอม มีกลีบเลี้ยงเล็ก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก ดอกบานเต็มที่ 2-3 ซม. ออกหมุนเวียนตลอดปี

ผล : จะออกเมื่อดอกโรย มีลักษณะกลมสีแดงทรงกลมเป็นเล็กน้อย ขนาด 2-4 ซม. เมื่อสุกสีแดงปนดำ มี 6-10 เมล็ด คล้ายๆ ผลแอปเปิ้ลรับประทานได้

ถิ่นกำเนิด : ในแอฟริกาใต้

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

เวลาออกดอก : หมุนเวียนตลอดปี

อัตราการผลิต : โตช้า
การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ดินร่วนซุย
ลักษณะนิสัย : ดินร่วนระบายน้ำได้ดี
ความชื้น : ปานกลาง
การขยายพันธุ์ : เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในที่ร่วนซุย ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งหรือปักชำ
ประโยชน์ : ผลรับประทานได้มีรสเปรี้ยว ใช้ทำเชลลี่
ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :
เอกสารอ้างอิง : พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองพิมพ์ครั้งที่ 3

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-024

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Juniperus horizontalis* Moneh.

ชื่อวงศ์ : CUPRESSACEAE

ชื่อสามัญ

ชื่ออื่นๆ : สนเลื้อย

ลักษณะทั่วไป



ใบ : ใบเป็นอิสระ โดยจะเป็นรูปร่างแตกต่างกันออกไป ใบเป็น
ข้อสวดยี่สิบเอ็ดเหลี่ยม

ถิ่นกำเนิด :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : อยู่ในแสง 60-90 เปอร์เซ็นต์

เวลาออกดอก :

อัตราการเจริญเติบโต :

ลักษณะนิสัย :

ความชื้น :

การขยายพันธุ์ :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

ประโยชน์ : ใช้ประดับตกแต่งทั่วไป

เอกสารอ้างอิง : สวนในบ้าน เล่ม 4 การจัดสวนถาด

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-025

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Veitchia merrillii*

ชื่อวงศ์ : PALMS

ชื่อสามัญ : Manila palm

ชื่ออื่น ๆ : หมากนวล

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นพรรณไม้ปาล์มที่มีลำต้นเดี่ยว จะไม่มีหน่อ ลำต้นสูงและจะเห็นข้อปล้องได้ชัดเจน ลำต้นสูงประมาณ 20 ฟุต ลำต้นสีน้ำตาลปนเทา ขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร มีข้อสีเขียว นวลยาว 30-50 เซนติเมตร มีรอยหลุดของก้านใบ ถัดชัดเจน



ใบ เป็นไม้ใบรวม ลักษณะของใบนั้นเป็นรูปขนนก ทางใบยาวราวๆ 30 นิ้ว มีสีเขียวอ่อนสด โคนทางใบจะเป็นกาบห่อหุ้มลำต้น อยู่มีสีเขียวอ่อนปนขาว นวลใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 45-75 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ้น แผ่นใบสีเขียว



ดอก เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศเช่นเดียวกับดอกมะพร้าว และลักษณะของดอกที่ออกจะเป็นช่อคล้ายกับจันทน์หอม มีสีขาวอมเหลือง ส่วนก้านดอกเป็นสีขาวนวล จึงมองเห็นทะลายของ ปาล์มนี้ได้ชัดเจนสีเหลืองนวล ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงได้ โคนกาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร



ผล : เมื่อดอกร่วงโรยก็จะติดผล ขนาดของผลกลมรี คล้ายกับลูกมะกอกน้ำ เมื่ออ่อนเป็นสีเขียวอมเทาหรือสีครีมพอขมแก่เป็นสีแดงสด มีเมล็ดอยู่ด้านในเมล็ดเดี่ยวผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงกลมรี ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก ผลสุกสีแดงส้ม

ถิ่นกำเนิด

: มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศฟิลิปปินส์

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

: หนทางต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้พอควร ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

อัตราการเจริญเติบโต

: ช้า

ลักษณะนิสัย

: ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี

สถานที่ที่ชอบขึ้น

: เป็นพรรณไม้กลางแจ้งชอบแสงแดด จะเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด

การขยายพันธุ์

: ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-026

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Streblus asper* Lour

ชื่อวงศ์ : MORACEAE

ชื่อสามัญ : Siamese rough bush

ชื่ออื่น ๆ : ข่อย

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นตรง เปลือกมีสีเทาอ่อนข้างขาวแตกออกเป็นแผ่นบาง ๆ ไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมี

ความสูงประมาณ 10-12 เมตร ผิวเปลือกลำต้นมีเทาอ่อนข้างขาว โคนลำ

ต้นตรงเนื้อไม้เหนียวส่วนบนค่อนข้างคดงอเป็นปุ่มปมและเป็นร่อง

เล็กน้อย ทรงพุ่มทึบค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปทรงกระบอก

ใบ มีสีเขียวและหนา แข็ง ใบจะสากระคายคล้ายกับกระดาดทราย

ขอบใบขนานเรียบ มนรี ปลายใบแหลม ใบออกจากปลายกิ่ง

มีขนาดเล็กหนาหยาบคล้ายกระดาดทราย มีสีเขียวขอบใบเรียบ โคนใบ

มนแหลม ปลายใบแหลม

ดอก ดอกจะมีสีเหลืองออกขาวนิดๆ ดอกมีขนาดเล็กออกดอกเป็นช่อ

ดอกเล็กสีขาวและเหลือง

ผล : มีลักษณะกลมสีเหลืองคล้ายเมล็ดพริกไทย ผลกลมเล็กเท่าหัวเข็มหมุด เรียบ

สีขาวหรือเทาเปลือกมียางสีขาว ผลสุกสีเหลือง

ถิ่นกำเนิด : ถิ่นเดิมอยู่ใน จีน อินเดีย มาเลเซีย

สถานที่ที่พบขึ้น : ปลูกได้ทั้งในแดด และที่ร่ม

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะจากเมล็ด

ประโยชน์ : รากใช้บำรุงหัวใจ เมล็ดช่วยเจริญอาหาร ขับลม อืดเฟ้อ ใบ ชงกับน้ำแก้ปวดประจำเดือน

เอกสารอ้างอิง : พืชสมุนไพร

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-027


ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Phoenix roebanii* O' Brain ex C.Robelen

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ชื่อสามัญ : Dwarf Date Palm

ชื่ออื่น ๆ : ปาล์มสิบสองปีนนา

ลักษณะทั่วไป



ต้นเป็นพรรณไม้ปาล์มมีลำต้นเดี่ยวไม่มีหน่อออกมา ส่วนยอดของลำต้นจะมี ลักษณะเป็นกาบขนาดลำต้นที่เล็ก และเติบโตช้า มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร ส่วนก้านใบนั้นยาว 60 - 120 เซนติเมตร เป็นต้นเดี่ยว และต้นกอ ลำต้นขนาด 6-12 เซนติเมตร สูงประมาณ 3-5 เมตร

ใบ ใบมีลักษณะเป็นรูปขนนก ทางใบโค้งยาวลงมาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ทางใบเป็นหนามค่อนข้างแหลมมีสีเขียวอ่อน ใบย่อยยาว 13-20 เซนติเมตร หลังใบมีสีเขียวแก่เรียบเป็นมัน ได้ท้องใบมีสีเขียวอ่อนปนเทาเหมือนกับมีผงแป้งขาวปกคลุมเป็นใบเป็นแบบใบมะพร้าว มีใบย่อยประมาณ 100 ใบ ก้านใบจัดเรียงในระนาบเดียว ส่วนใบย่อยเรียงเป็นสองข้าง ใบย่อยแต่ละใบยาว 15-25 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร ลักษณะโค้งลง สีเขียวอมเทา ด้านใต้ใบมีขนเล็กๆ

ดอก เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศแยกอยู่คละต้น ดอกตัวผู้ดอกออกเป็นช่อสั้นขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนดอกเมื่อแก่จะร่วงหล่นลงไป ดอกตัวเมียออกเป็นช่อระหว่างโคนใบช่อดอกยาว 30-37 เซนติเมตรปลายช่อดอกจะแยกแตกแขนงออกคล้ายไม้กวาดออกเป็นช่อสีเขียวปนเหลืองอ่อน ออกตามโคนกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร

ผล ผลมีลักษณะกลมรีขนาดเท่าถั่วแดงผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีส้มดำในผลมี เมล็ดรูปกลมรี คล้ายเมล็ดกาแฟเป็นผลรี เมื่อสุกจะมีสีแดงปนดำ ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร ออกเป็นพวง

ถิ่นกำเนิด : ประเทศในแถบอินโดจีน ภาคเหนือของไทย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : พบปะปรายในที่โล่งแจ้ง และพบในทุ่งหญ้าที่มีน้ำขัง

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ทนต่อแสงแดด ความชื้นปานกลาง

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด และแยกหน่อ

ประโยชน์ : นิยมใช้เป็นประธานในสวนหย่อม ทนน้ำท่วมขังและ สวຍงาม
ราคาไม่สูงใช้ เป็นไม้กระถางปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะมีขนาดเล็ก
เติบโตช้า รูปใบสวยงาม ใช้เป็นไม้ประดับสวนทั่วไป

เอกสารอ้างอิง : พรรณไม้ในงานสถาปัตยกรรม

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-028

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ehretia microphylla* Lamk.

ชื่อวงศ์ : EHRETIACEAE

ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น ๆ : ชาฮกเกี้ยน

ลักษณะทั่วไป



ต้น รูปทรงไม่สม่ำเสมอ ลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมากเป็นพุ่มแน่นทึบ



ใบ ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบเดี่ยว เรียงสลับ มักออกเป็นกระจุกสั้นๆ ตามกิ่ง รูปไข่กลับแคบ กว้าง 0.5-2 เซนติเมตร ยาว 1-4 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นพูแหลมมักเป็นติ่งแหลมอ่อน โคนใบรูปกลม ขอบใบหยักผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันค่อนข้างหนาด้านหลังใบสีเขียวอ่อน



ดอก ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบ มีดอกย่อย 2-5 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปแถบ สีเขียวอ่อน ด้านนอกมีขนยาว ประปราย โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อยเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8 มิลลิเมตร

ผล : ผลสด รูปกลมขนาด 6 มิลลิเมตร สีส้มแดง มี 4 เมล็ด

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง

ลักษณะนิสัย : ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี

ความชื้น : ปานกลาง-ต่ำ

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ชอบดินร่วน ความชื้นปานกลาง แสงแดดจัด

เวลาออกดอก : ฤดูร้อนตลอดปี

ประโยชน์ : ใช้ปลูกตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ สวนหย่อม

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-029


ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Juniperus junghuniana* Mig.

ชื่อวงศ์ : CUPRESSACEAE

ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น ๆ : สนมังกร

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นไม้รูปทรงปิรามิดทรงพุ่ม ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ความสูง 3-12 เซนติเมตร ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม

ใบ ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบความชื้นปานกลาง ชอบแสงเต็มวัน นิยมปลูกเป็นไม้ประธานในการจัดสวน นิยมปลูกเป็นกลุ่ม 3 หรือ 5 ต้น ปลูกเป็นแนวถนน การดูแลไม่ควรรดน้ำทรงพุ่มเพราะจะแตกทรงพุ่มไม่สวย



ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น

สถานที่ที่ชอบขึ้น: ขึ้นได้ในดินทั่วๆ ไป ความชื้นปานกลาง แสงแดดอ่อน ๆ

ประโยชน์ : ใช้ปลูกประดับตกแต่งสวน สถานที่ต่าง ๆ ให้ร่มเงา

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-030

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Codiaeum Varieatum* Blum.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ : Croton

ชื่ออื่น ๆ : โกสน

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดต่าง ๆ สูงใหญ่ไม่เท่ากัน สามารถสูงถึง 15 ฟุต เป็นพรรณไม้ยืนต้นประเภทไม้พุ่มขนาดย่อมลำต้นมีความสูงประมาณ 3-5 เมตร ผิวลำต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทา ลำต้น ตรง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มตรงกลม

ใบ : ใบของโกสนมีหลายสี คละปะปนกันไปตามบนแผนใบแล้วแต่ชนิด เกิดจากลูกผสม ลักษณะใบโกสนจะมีรูปร่างแปลก ใบแฉก ใบกลม ใบคด บิดเป็นเกลียว ใบป้อม โกสนเป็นพันธุ์ไม้ที่ผสมง่าย กลายพันธุ์เร็วใบแตกออกจากต้นและปลายกิ่ง ลักษณะใบมีรูปร่างสีต้นขนาด แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดพันธุ์

ดอก : ดอกจะออกเป็นพวงห้อยลงมา มีสีขาว ดอกจะคล้ายดอกกระถินเวลาบานเต็มที่จะเห็นเกสรตัวผู้เป็นเส้นฝอยๆ บานเป็นรูปทรงกลม แต่ดอกโกสนแท้ ๆ จะเล็กมากซึ่งจะอยู่บนกลีบรองดอก มี 5 กลีบ ดอกออกเป็นพวงห้อยลงมาด้านล่างซึ่งออกมาจาก ปลายกิ่งพวงหนึ่งยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตรดอกมีสีขาวดอกเล็กมากมีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่จะเห็นเกสรตัวผู้เป็นเส้นฝอย การบานของดอกเป็นรูปทรงกลม

ถิ่นกำเนิด : แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนผสมใบไม้และปุ๋ยอินทรีย์ ระบายน้ำได้ดี

การขยายพันธุ์ : การปักชำ การตอน

ประโยชน์ : ไม้พุ่มตัดแต่งได้

เอกสารอ้างอิง : พรรณไม้ในงานสถาปัตยกรรม

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-031

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Cyrtostachys renda* Blum.

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ชื่อสามัญ : Sealingwonn Palm .

ชื่ออื่น ๆ : หมากแดง

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ปาล์มสกุลเดียวที่มีหน่อกาบใบ และก้านใบเป็นสีแดงสดลำต้นเป็นข้อปล้อง เปลือกสีน้ำตาลเรียบ มีกาบใบห่อหุ้มลำต้นซึ่งเป็นสีแดงสด สูง 15 ฟุต

ใบ : เป็นไม้ใบรวม ก้านทางใบประกอยด้วยใบหลายใบ ทางใบยาว

ประมาณ 3-4 ฟุต ส่วนใบย่อยจะเรียวยาวสีเขียว ก้านใบและทางใบมีสีแดง

ดอก : ออกเป็นช่ออยู่ตามข้อของต้นได้กาบใบ และเป็นสีแดงด้วย ช่อดอกจะยาว

ผล : ผลมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วเขียว เมื่อแก่จะมีสีดำ

ถิ่นกำเนิด : อยู่ในประเทศไทย มาเลเซีย หมู่เกาะในแปซิฟิก



การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : บริเวณป่าพลู ทางภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ไม่ชอบแสงแดด ควรปลูกในดินร่วน

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด การแยกหน่อ

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ยอดใช้ปรุงสุกกินได้ เนื้อไม้สีแดงใช้ก่อสร้างได้สวยงามทนทาน

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง : บางกอกกอล์ฟคลับพรรณไม้ (เล่ม1)

อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-032

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Excoecaria cochinchinensis*, Lour.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ : Picara

ชื่ออื่น ๆ : ลั่นกระบือ

ลักษณะทั่วไป



ต้น ไม้ทรงพุ่มขนาด 1 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสีเขียว อมม่วงแดง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นทึบ



ใบ ใบมีลักษณะหลังใบสีเขียวเข้มท้องใบสีแดง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2-4.5 เซนติเมตร ยาว 4-13 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบจักฟันซี่เกือบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม เป็นมัน ผิวใบด้านล่างสีม่วงแดงหรือม่วงน้ำตาล ดอก ดอกมีสีเขียว สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 1-2 เซนติเมตรดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อดอกเพศผู้มีดอกเล็กๆจำนวนมาก ดอกเพศเมียสั้นกว่าช่อดอกเพศผู้ และมีต่อมเล็ก ๆ กลีบดอก 3 กลีบ

ผล : ผลแห้งแตก ค่อนข้างกลม มีขนาดเล็ก มี 3 พู

ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่พบขึ้น : ดินทุกชนิด ความชื้นปานกลาง

เวลาออกดอก : ฤดูฝน

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : การตอน การปักชำ

ประโยชน์ : ใช้ปลูกประดับสวนพุ่มหรือกอใหญ่ ไม่นิยมปลูกสวนหย่อมใกล้บ้านเพราะมีลำต้นสูง

เอกสารอ้างอิง : ไม้ประดับใบจัดแต่งบ้านและสวน

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-033

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Crinum asiaticum</i> Linn.
ชื่อวงศ์	: LILIACEAE
ชื่อสามัญ	: Crinum. Lily, Eoison Balb
ชื่ออื่น ๆ	: พลับพลึง

ลักษณะทั่วไป



ต้น : มีลำต้นอวบใหญ่เนื้อในขาว และอ่อนนุ่ม ต้นจะสูง 3-4 ฟุตเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นใต้ดินเป็นหัวกลม ส่วนที่โผล่พ้นดินเป็นกาบใบอัดกันแน่นเป็นพืชมล้มลุก มีลำต้นใต้ดิน หัวกลม เนื้อในต้นขาวอ่อนนุ่ม มีกาบสีขาวหุ้มต้น เป็นคล้ายกำบังใบและเปลือกของต้น



ใบ : ขึ้นรวมกันเป็นกอใหญ่ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกซึ่งปลายใบจะแหลมขอบใบเรียบไม่มีจักมีสีเขียว ที่โคนใบจะเป็นกาบใบห่อหุ้มเป็นเปลือกของลำต้นอยู่ผิวเนื้อใบอ่อนนุ่ม หนาและเหนียวใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบเป็นมันเรียบ ลักษณะแคบ เรียวยาว เรียงเวียนรอบ แกนลำต้นใบมีลักษณะแคบ เรียวยาว อ่อนนุ่ม สีเขียวสด

ดอก : ออกดอกเป็นช่อใหญ่ขึ้นอยู่กลางกอ ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 15-20 ดอกลักษณะกลีบดอกแคบ เรียวยาวมี 6 กลีบ ต่อ หนึ่งดอก เวลาริบานเต็มที่ดอกจะงอแงเข้าหาก้านดอก เกสรจะยาวยื่นออกมากลางดอกด้านบนของดอกเป็นสีม่วง ด้านล่างเป็นสีแดงเข้ม กลิ่นหอมออกดอกเป็นช่อ มีก้านช่อดอกยาว ดอกมีลักษณะคล้ายปากแตร กลิ่นหอมฉุน ผลค่อนข้างกลม สีเขียวอ่อนดอกออกเป็นช่อ มีก้านดอกยื่นออกมาจากกอ ลักษณะคล้ายปากแตร มี 6 กลีบ สีแดงอมส้มม่วงอ่อน ถ้าบานเต็มที่จะมีม่วงจาง มีกลิ่นหอมฉุน

ถิ่นกำเนิด : ทวีปแอฟริกา

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ไม่ชอบแดด ชอบดินร่วนซุย

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : การแยกหน่อ

ประโยชน์ : นำมารับประทานทำให้อาเจียนเป็นเสมหะ ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง เป็นยาระบาย รักษาโรคเกี่ยวกับ น้ำดี โรคเกี่ยวกับปัสสาวะ

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-034

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Cordyline fruticosa* Goeppert.

ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE

ชื่อสามัญ : Dracaena Plam

ชื่ออื่น ๆ : หมากผู้หมากเมีย

ลักษณะทั่วไป



ต้น : ไม้ยืนต้น ไม้ยืนต้นขนาดเล็กลักษณะเป็นพุ่ม ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นมีขนาดเล็กกลม ลำต้นมีข้อถี่ ลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรงมีขนาดเล็กกลม



ใบ : ใบหนารูปหอกยาวโคนก้านใบเรียวยาว เนื้อใบหนาอ่อนนุ่ม ใบมีสีต่าง ๆ เช่น เหลือง ส้ม แดง ชมพู ขาว หรือมีหลายสีเป็นแถบในแผ่นเดียวกันใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงส่วนยอดของลำต้น แตกใบตามข้อ ต้นใบเป็นรูปหอกปลายใบแหลมขอบใบเรียบและมีก้านใบหุ้มลำต้นใบออกเรียงเป็นชั้นสลับกันขนาดใบและสีสรรจะแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์

ดอก : ออกดอกเป็นช่อสีม่วง หรือ ขาว มีกลิ่นหอมออกดอกเป็นช่อออกตรงส่วนยอดของลำต้น ปลายช่อดอกมีกลุ่มดอกเล็ก ๆ สีขาว ช่อหนึ่งจะมีช่อดอกย่อยประมาณ 5-10 ดอก

ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินทั่วไป ชอบแดดรำไร

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : โดยการปักชำ การตอนกิ่ง

ประโยชน์ : ใช้ปลูกประดับตกแต่งอาคาร เพราะมีลักษณะใบที่สวยงาม มีอยู่หลายพันธุ์ซึ่งจะมีลักษณะใบแตกต่างกัน

เอกสารอ้างอิง : หนังสืออาณาจักรสิ่งมีชีวิต เล่ม 1 อาณาจักรโมเนอวา อาณาจักรโปรติสตาอาณาจักรพืช

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-035

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Pleomele reflexa* variegatum

ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE

ชื่อสามัญ : Song of India

ชื่ออื่น ๆ : ซองออฟอินเดีย

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลำต้นกลมสีน้ำตาลอ่อน แตกแขนงตาม

ข้อ และจะแตกหน่อจากโคนของลำต้น ถ้าเลี้ยงไว้นานๆ เข้าอาจจะสูงได้ถึง 10 ฟุตเลยทีเดียวแตกแขนงตามข้อของลำต้นและสามารถแตกหน่อจากโคนต้น ใบ ออกถี่เวียนรอบลำต้น ลำต้นกลมสีน้ำตาล



ใบ : แตกใบออกกระจายรอบๆ ต้นระยะใบที่ออกจะถี่มากส่วนยอดของต้นจะแตกใบอ่อน ลักษณะของใบปลายใบจะแหลมเรียวขอบใบเป็นสีเหลือง ส่วนกลางของใบเป็นสีเขียว ใบกว้างประมาณ 1.5-2 นิ้วยาว 6-8 นิ้วใบมีสีเขียวตรงกลางขอบใบมีสีเหลืองทอง ใบแข็งและ

หนา ปลายใบแหลมเจริญเติบโตได้ช้ามากเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของใบไม่ค่อยมีคลอโรฟิลล์ ใบแคบเรียวแหลม บริเวณขอบใบด่างสีเหลือง ส่วนกลางใบมีสีเขียว

ถิ่นกำเนิด : ตอนใต้ของอินเดียและศรีลังกา

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ชอบดินที่ปนทรายและดินที่ร่วนซุย ชอบน้ำมาก

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนอื่น ๆ : มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอินเดียตอนใต้และลังกา (South India, Ceylon)

ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับ สวยงาม

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-036


ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dracaena fragrans* Ker Gawl.

ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ : Dracaena

ชื่ออื่น ๆ : วาสนา


ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นเดี่ยว ๆ สูงขึ้นเป็นลำตรง ลำต้นจะไม่มีกิ่งก้าน แต่จะมีข้อติด ๆ กันคล้ายอ้อย แต่ถ้าจะปลูกเป็นไม้ประดับมักนิยมปลูกเป็นไม้ทรงพุ่มต่ำ ๆ และจะสูงไม่เกิน 3 ฟุตโดยปกตินั้น วาสนาจะสูงประมาณ 5-10 เมตร

ใบ : เป็นไม้ใบเดี่ยว แต่จะออกถี่มากซ้อน ๆ กัน เป็นชั้น ๆ ไปตามข้อต้น พื้นของใบเป็นสีเขียวอ่อน แต่ขอบใบเป็นสีเขียวเข้มและมีลายเส้นขาวลากด้วยทั้งสองด้าน ตอนกลางใบมีลายสีเหลืองพาดเป็นทาง ส่วนลักษณะของใบนั้นเป็นรูปหอกเรียวยาว ประมาณ 2-2.5 ฟุตเนื้อใบเรียบเกลี้ยง ใบตรงส่วนโคนจะมีสีจางกว่าใบตรงส่วนยอด

ดอก : จะออกดอกรวมกันเป็นช่อ ๆ แน่นติดกันเป็นรูปวงกลมคล้ายกับทรงดอกกะหล่ำ ดอกมีสีขาวบนสะพานอยู่เต็มต้นและเวลาที่ออกดอกสวยงามเวลากลางคืนจนถึงใกล้เช้าจะผลิตดอกเป็นระยะ ๆ ไปเรื่อย ๆ



ถิ่นกำเนิด : เป็นพรรณไม้ของประเทศกินี ในทวีปแอฟริกา

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดจัด

สถานที่ที่ชอบขึ้น : เจริญงอกงามได้ดีในดินที่ร่วนซุย ต้องการน้ำ และความชื้นปานกลาง

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตัดลำต้นเป็นข้อ ๆ ไปปักชำ

ประโยชน์ : วาสนาเป็นพรรณไม้ที่คนไทยและจีนถือกันว่า เป็นต้นไม้เสี่ยงทาย หากใครปลูกได้เจริญงอกงามก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-037

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Pachystachys lutea* Ness

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ : Lollipop Plant

ชื่ออื่น ๆ : เหลืองศิริบุญ

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นไม้ทรงพุ่มตั้งตรงขนาดเล็ก สูงประมาณ 60 ซม. ไม้ดอก
ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง



ใบ : ใบรูปไข่รียาว ปลายเรียวแหลมออกจากลำต้นลักษณะ
ตรงกันข้าม ใบมีขนละเอียดปกคลุม เส้นใบอยู่ลึก ทำให้ใบเป็นคลื่น
ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 4-5
เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบ
ใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวสด เป็นคลื่น เส้นใบเป็นร่องเห็นชัดเจน มีขน
ละเอียดปกคลุม

ดอก : ดอกออกเป็นช่อตั้งตรงมองเห็นกลีบประดับสีเหลือง ดอกมีสีขาวเล็ก ๆ ออกตามซอกกลีบ
ประดับ สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งขึ้น ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
ใบประดับสีเหลืองสดเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันขึ้นเป็นแถว ดอกเป็นแผ่นแบน เกิดตามซอกใบ
ประดับใกล้ปลายช่อดอก

ถิ่นกำเนิด : อเมริกาใต้

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วน ความชื้นปานกลาง

เวลาออกดอก : ตลอดปี

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ปักชำหรือตอนกิ่ง

ประโยชน์ : ปลูกไว้เพื่อความสวยงาม

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-039

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Pleomele reflexa angustifolia*

ชื่อวงศ์ : LILIACEAE

ชื่อสามัญ : Malaysian Dracaena

ชื่ออื่น ๆ : หวายเขียว

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นหน่ออยู่ใต้ดิน เป็นกอขนาดกลาง แตกแขนงออกตามข้อ

ต้น ต้นกลมมีขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อน

ใบ : มีสีเขียว ขาวริ แตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของลำต้นใบจะออกอยู่รอบๆ ลำต้น ผิวใบและขอบใบเรียบไม่มีจัก ปลายใบแหลม โคนใบสอบเข้าหาก้านใบ โคนก้านใบเป็นกาบห่อหุ้มลำต้น

ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนหรือดินปนทราย ที่ระบายน้ำได้ดีชอบน้ำมากแต่ไม่ชอบน้ำขังและ

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : ปักชำยอดหรือส่วนของลำต้น

ประโยชน์ : ปลูกไว้เพื่อความสวยงาม

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-040

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dracaena reflexa* "Green"

ชื่อวงศ์ : LILIACEAE

ชื่อสามัญ : Song of jamica

ชื่ออื่น ๆ : ซองออฟจาไมกา

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ 34 เมตร ถ้าตัดยอดบ่อย ๆ ทรงพุ่มจะแผ่กว้างโดยประมาณกว้าง 2 เมตร ลำต้นกลม

ใบ ใบออกจากลำต้นหนาแน่น ใบแคบเรียวยาว ฐานใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น พื้นใบสีเขียว มีลายแถบสีเหลืองอมเขียวตามความยาวของใบ ใบจะมีสีเขียวและส่วนล่างจะอยู่ตรงกลางสีก็ไม่ใช่สีเหลืองทองเหมือนซองออฟอินเดียนแต่จะเป็นสีเขียวอ่อน



ถิ่นกำเนิด : ประเทศจาไมกา

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่พบขึ้น :

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : การตอนหรือปักชำ

ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับภายนอกอาคาร

เอกสารอ้างอิง : ไม้ประดับใบจัดแต่งบ้านและสวน เล่ม 1

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-041

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Roystonea regia* (Runth) Cook.

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ชื่อสามัญ : Royal Palm

ชื่ออื่น ๆ : ปาล์มขวด

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นปาล์มที่มีลำต้นเดี่ยว ไม่มีหน่อ และลำต้นตั้งตรงถ้าโตเต็มที่สูงประมาณ 50-70 ฟุต เมื่อต้นอายุยังน้อยโคนจะป่องโตออก คล้ายกับขวดพอต้นโตขึ้นจะค่อย ๆ หายไป เป็นปาล์มที่มีลำต้นสะอาดเรียบสีน้ำตาลลำต้นคอดใกล้โคนและป่องกลาง ลำต้นขนาด 50 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่สีเทาเห็นข้อปล้อง

ชัดเจน คอสีเขียวเข้มและยาวถึง 1 เมตร



ใบ ออกเป็นทางยาวประมาณ 6-10 ฟุตแต่ละทางประกอบด้วยใบ มาก ทางใบมีกาบใหญ่ห่อหุ้มลำต้น กาบใบมีสีเขียวเป็นมัน ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 90 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมโคนใบรูปปลีมน แผ่นใบหนา แตกออก 2 ทิศทางห้อยโค้งลงจึงเห็นเป็นพวงใหญ่ โคนกาบใบสีเขียวห่อลำต้นไว้ ก้านใบย่อยเป็นสันคม




ดอก ออกดอกเป็นจั่นคล้ายกับต้นหมาก ดอกจะออกในทางกาบใบจั่นจะโตและยาว เมื่อโตจะแตกแขนงและมีดอกเล็ก ๆ ติดอยู่มากมาย เป็นดอกไม้สมบูรณ์เพศสีขาวครีมเป็นมัน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงได้ โคนกาบใบดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นช่อดอกยาวประมาณ 1 เมตร



ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดผลจำนวนมาก ทรงกระบอกค่อนข้างป้อม ปลายแคบแหลม

ขนาด 0.8-1.3 เซนติเมตร ผลแก่สีน้ำตาลอมม่วง



ถิ่นกำเนิด : ประเทศคิวบา
การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :
สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินทั่วไป ทนดินเค็ม
เวลาออกดอก :
เวลาออกผล :
การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด
ประโยชน์ : ปลูกในที่กว้างเพื่อประดับสถานที่
เอกสารอ้างอิง : พรรณไม้ในภูมิสถาปัตยกรรม

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dracaena godseffiana*
ชื่อวงศ์ : LILIACEAE
ชื่อสามัญ : Gold – dust dracaena
ชื่ออื่นๆ : ไผ่ฟิลิปปินส์

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก เจริญเติบโตรวมกันอยู่เป็นกอคล้ายกับกอไผ่ แตกกิ่งก้านสาขาตรงส่วนโคนของต้น ลักษณะของลำต้นจะกลมและตรง

ใบ : จะแตกใบตรงส่วนยอดของลำต้น ครั้งละ 2-3 ใบ ลักษณะของใบเป็นไข่ ปลายใบแหลม และโคนใบสอบ พื้นใบเป็นสีเขียวเข้ม และจะมีจุดสีขาวเหลืองหรือสีเหลืองเล็ก ๆ ประกระจายอยู่ทั่วไปของใบ มีก้านใบที่สั้น



ถิ่นกำเนิด : มีถิ่นกำเนิดอยู่ในคองโก (Congo)

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : เป็นไม้ที่ชอบอยู่ในที่มีแสงแดดรำไร ถ้าปลูกไว้ในห้องก็ต้องมีแสงสว่างพอ

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุยมีการระบายน้ำได้ดี และจะต้องน้ำมาก ความชื้นปานกลาง

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอและปักชำ

ประโยชน์ :

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-048

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Spathiphyllum clevelandii*.

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ชื่อสามัญ : Peace Lily

ชื่ออื่น ๆ : เดหลี

ลักษณะทั่วไป



ไม้กอขนาดเล็ก ลำต้นสั้น แตกใบเป็นกอ ก้านใบยาว โคนก้านใบแผ่เป็นกาบใบเป็นรูปหอกฐานใบกว้าง ค่อย ๆ เรียวสอบแหลมไปทางปลายใบ ขอบใบหยักเป็นลอนเล็กน้อยใบสีเขียว ออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกหน้าวัวแต่มีขนาดเล็กกว่าจานรองดอกมีสีขาว



ถิ่นกำเนิด : อเมริกาเขตร้อน

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น: ขึ้นในที่ร่มสนิท

เวลาออกดอก : ออกดอกตลอดปี มีกลิ่นหอม มีสีขาว
บานได้ 20 วันถึง 1 เดือน หอมตอนเช้า

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : แยกกอ แยกหน่อ ขยายกอ แยกเหง้า

ประโยชน์ : ตกแต่งสวนเป็นแปลงยาว จัดประดับตามห้อง ดอกไม้ใช้สื่อแมลงวันทองที่ทำอันตรายให้ผลไม้

เอกสารอ้างอิง : หนังสือดอกไม้หน้าปลูก



ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-051


ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Philodendron* sp. “Red Emerald “

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ชื่อสามัญ : Philodendron

ชื่ออื่นๆ : ฟิโลเดนดรอน

ลักษณะโดยทั่วไป :



ต้น : ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก ลำต้นอวบน้ำ เลื้อยพันด้วยรากพิเศษที่
ออกตามข้อ

ใบ : ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน
พื้นใบสีเขียวอ่อนแกมเหลืองแผ่นใบหนาแน่น ก้านใบสีชมพู



ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-052

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Pandanus veriegatus* Miq

ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE

ชื่อสามัญ : Screw Pine

ชื่ออื่น ๆ : การะเกด

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ประเภทเดียวกับต้นเตย ลักษณะของลำต้นจะแตกเป็นกอใหญ่ ต้นสูงประมาณ 4-6 เมตร บริเวณโคนต้นมีรากอากาศ

ใบ : ใบคล้ายใบสับปะรด ใบใหญ่ยาว หนาขอบริมใบหยักมีหนามแหลมคม ได้ท้องใบมีแกนกลาง

ดอก : ดอกออกกลางลำต้น ดอกเริ่มบานตอนเย็นมีกลิ่นฉุนฉุนกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ตามชายน้ำ และพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ขึ้นใกล้ชายฝั่งทะเล

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : การแยกกอ หรือหน่อ

ประโยชน์ : ตกแต่งสถานที่

เอกสารอ้างอิง : อนุกรมวิธานพืชอักษร ก. ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-059

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Catharanthus roseus* L. G.Don

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : Madagascar Periwinkle

ชื่ออื่น ๆ : แพงพวย

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้น้ำชนิดหนึ่งของไทย มีลำต้นอ้วนอวบ สามารถแตกสาขาเลื้อยทอดคยอกในน้ำไปได้ไกล ตามข้อปล้องของต้นนั้นจะมีปลอกสีขาวคล้ายลำไส้

ซึ่งเรียกว่าท่อน ทำหน้าที่ประคองลำต้นให้ลอยอยู่บนน้ำได้ ท่อนนี้ชาวชนบทส่วนมากจะเรียกว่า “นม”

ใบ : มีสีเขียวเข้ม แตกออกตามข้อปล้องของต้น ใบเป็นรูปมนกลม เนื้อใบจะหนาและอวบ ขนาดของใบยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว



ดอก : เป็นพรรณไม้น้ำที่มีดอกสวยงามชนิดหนึ่ง ดอกจะมีสีเหลืองอ่อนๆหรือสีขาว วงในของดอกหรือเกสรจะเป็นสีเหลืองสด กลีบดอกจะมีอยู่ 6 กลีบและบานเต็มที่ประมาณ 1-1.5 นิ้วถ้าในบริเวณที่มีต้นแพงพวยนั้นน้ำไม่แห้งในฤดูแล้ง ดอกจะตกและออกตลอดปี ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ

ถิ่นกำเนิด : เป็นพรรณไม้ของไทย ที่จะพบได้ตามห้วยหนองบึงทั่วๆ ไป

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : เป็นพรรณไม้น้ำที่ชอบแสงแดดจัด ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้เร็ว

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ปลูกในน่านน้ำที่มีความกว้างพอควร ยิ่งกว้างเท่าใดก็จะแผ่

กระจายได้มากเท่านั้น

การขยายพันธุ์ : โดยการแยกต้นปลูกไว้ในน้ำ ก็จะขยายพันธุ์แตกสาขาเต็มบ่อ

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-064

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dalbergia errans* Craib.

ชื่อวงศ์ : FABACEAE

ชื่อสามัญ : Sissoo

ชื่ออื่น ๆ : ประดู่กิ่งอ่อน


ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีลำต้นสูงประมาณ 25 เมตรหรือ
อาจจะ

กว่านี้ก็ได้ เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำคล้ำและจะแตกสะเก็ด
ออกเป็นร่องตื้นๆ

ใบ : เป็นไม้ดอกที่ออกใบรวมกันเป็นช่อ ช่อหนึ่งๆมีอยู่ประมาณ 7-11
ใบลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมนและขอบใบเรียบ
ไม่มีจัก ใบยาวประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว มีสีเขียว



ดอก : ออกเป็นช่อ อยู่ตามปลายกิ่ง หรือโคนก้านใบช่อดอก
จะใหญ่ดอกมีสีเหลืองแต่ขนาดดอกจะเล็ก

ถิ่นกำเนิด : ประดู่ชนิดนี้ เป็นพรรณไม้ของอินเดีย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

: เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดจ้าและอากาศที่ร้อน

สถานที่ที่ชอบขึ้น

: เป็นไม้ที่ต้องการน้ำปานกลาง ขึ้นได้ในดินทุกชนิด

เวลาออกดอก

:

เวลาออกผล

:

การขยายพันธุ์

: ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

ประโยชน์

: แก่น บำรุงโลหิต บำรุงร่างกาย แก่โลหิตจาง

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง

:

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-102

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dracaena sonderiana* "Silver"

ชื่อวงศ์ : LILIACEAE

ชื่อสามัญ : Ribbon plant

ชื่ออื่น ๆ : หวายต่าง

ลักษณะทั่วไป :



ลำต้น โดประมาณ 1-2 เซนติเมตร ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร
ลำต้นกลมตรงเล็กลำต้นเป็นข้อๆสีเขียวไม่มีกิ่งก้านสาขามีการเจริญการยืด
ตัวของข้อใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอด
ของลำต้น มีกาบใบหุ้มห่อลำต้น สลับกันเป็นชั้นๆ ตามข้อของลำต้น ใบ
แคบเรียวยาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบลงมาถึงกาบ
ใบพื้นใบมีสีเขียวหรือมีสีขาวพาดตามยาวของใบ ขนาดความกว้างของใบ
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร



ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย มีความชื้นสูง

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : การปักชำ

ประโยชน์ : การเป็นมงคล

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-134

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Aglaonema modestum* Schott

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ชื่อสามัญ : Chinese evergreen

ชื่ออื่น ๆ : เขียวหมื่นปี

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นไม้ประดับที่มีสีเขียวทั้งใบ และ ลำต้นลำต้นสูงประมาณ 1.5 2 ฟุต

ใบ : มีใบที่ใหญ่และเป็นสีเขียว ลักษณะของใบเป็นมัน ปลายใบจะแหลม โคนใบจะมน ก้านของใบยาวประมาณ 6 7 นิ้ว

ดอก : เป็นไม้ที่ไร้ดอกมีจุดเด่นที่ใบ



ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ในร่มหรือในอาคาร ต้องการน้ำปานกลาง

เวลาออกดอก : เป็นไม้ประดับไร้ดอก มีจุดเด่นตรงใบ

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : ด้วยก้านแยกหน่อ

ประโยชน์ : ปลูกประดับ ตามอาคาร

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง : พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-135

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Scindaosus aureus*

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ชื่อสามัญ : Marble Queen

ชื่ออื่น ๆ : พลูด่าง

ลักษณะทั่วไป



เป็นไม้เลื้อย ใบกลมป้อมขนาดใหญ่ ปลายใบมนแหลม
ฐานใบมนเว้า พื้นใบสีเขียวมีสีเหลืองด่างเป็นแถบตามแผ่น
ใบออกใบและรากตามข้อของลำต้นก้านใบยาว โคนก้านใบ
แผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้นตามข้อ

ถิ่นกำเนิด : มีถิ่นกำเนิดแถบหมู่เกาะโซโลมอน



การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น: ชอบแดดรำไร

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : การปักชำ

ประโยชน์ :

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-137

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Selaginella sp*
ชื่อวงศ์ : SELAGINELLACEAE
ชื่อสามัญ :
ชื่ออื่น ๆ : เฟิร์นกนกนารี
ลักษณะทั่วไป



ใบจะเป็นรีวคันเดี่ยว เจริญเติบโตโดยการแตกใบแล้วทอดยอดไปโดยการสร้างรากที่ข้อใบเพื่อยึดดินหาอาหาร ชอบชุ่มชื้นมาก แห้งนี้จะตาย ชอบร่มรำไร ใครมีสวนน้ำตกปลูกเป็นหย่อม ๆ จะทอดยอดหากันเอง



ถิ่นกำเนิด :
การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :
สถานที่ที่ชอบขึ้น :
เวลาออกดอก :
เวลาออกผล :
การขยายพันธุ์ :

ประโยชน์ :
ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :
เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-140

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ficus annulata*.

ชื่อวงศ์ : MORACEAE

ชื่อสามัญ : Banyan Tree

ชื่ออื่น ๆ : ไทร

ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีลำต้นแข็งแรง บางชนิดมีเรือนยอดเป็นพุ่มทรงหนาทึบ และบางชนิดเป็นทรงพุ่มโปร่ง บางชนิดมีรากอากาศ ห้อยย้อยลงมาตามกิ่งก้าน

ใบ ใบของต้นไทรนั้น จะมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามชนิดของมัน แต่โดยมากสีใบจะเป็นสีเขียว และมีสีเขียวต่างขาวหรือต่างขาวปนเทา ก็มี

ถิ่นกำเนิด : ถิ่นกำเนิดอยู่แถบทวีปเอเชีย อินเดีย ไทย จีน

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : เป็นไม้กลางแจ้ง ไม้เลื้อยดินปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี

สถานที่ที่ชอบขึ้น: ดินทั่วไป ความชื้นทั่วไปปานกลาง

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :



การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การตอน การปักชำ

ประโยชน์ : ใบกับราก รักษาแผล กิ่งและใบใช้แก้ปวดศีรษะ น้ำเลี้ยงของกิ่ง ใช้รักษาโรคตับ

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง : พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-170

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dracaena marginata* CV. Tricolor

ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE

ชื่อสามัญ : Rainbow Tree

ชื่ออื่น ๆ : เข็มสามสี

ลักษณะทั่วไป



ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก สีสวยงาม เป็นไม้ปลูกในกระถาง ลำต้นสูงประมาณ 5 ฟุต

ใบ : ใบจะออกสีเหลืองและมีขอบใบแหลมสีเขียวและสีแดงชมพูใบจะมีลักษณะยาว ปลายใบแหลมใบจะออกเรียงสลับกันขึ้นไปตามลำต้น

ดอก : เป็นไม้ประดับที่ไม่มีดอก มีใบสวยงาม



ถิ่นกำเนิด : ประเทศญี่ปุ่น

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : เจริญได้ดีทั้งในร่มรำไร และ

กลางแจ้ง ทนความแห้งแล้งดี

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : การปักชำ

ประโยชน์ :

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-172

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Polyscias fruticosa* Harms.

ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE


ชื่อสามัญ : Polyscias

ชื่ออื่น ๆ : เล็บครุฑ

ลักษณะทั่วไป



เล็บครุฑเป็นพรรณไม้ยืนต้น มีลักษณะเป็นพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นมีผิวเปลือกสีเขียวหรือสีน้ำตาล ลำต้นเป็นข้อเล็ก ๆ ผิวเปลือกเรียบหรือมีจุดเล็ก ๆ ประอยู่ทั่วต้น ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยติดอยู่ที่ก้าน ใบประมาณ 5-7 ใบ ขอบใบเป็นหยัก ใบมีสีเขียวเมื่อขยี้ใบจะมีกลิ่นฉุน ลักษณะของใบและขนาด ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ถิ่นกำเนิด



กำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น :

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ :

ประโยชน์ : ใบเล็บครุฑบางชนิดสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-181

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Polyalthia longifolia* Benth.& Hook.f.var.pandurata

ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE

ชื่อสามัญ : Cemetery Tree

ชื่ออื่น ๆ : อโศกอินเดีย

ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลาง เรือนยอดแตกเป็นพุ่มใหญ่ หนาทึบ

ใบ : ใบออกเป็นช่อ ๆ หนึ่ง มีใบย่อยเรียงสลับกันเป็นคู่ ช่อละ 2 - 3 คู่ ลักษณะของใบย่อย เป็นรูปขอบขนานคล้ายรูปหอกส่วนปลายใบ เรียวแหลม ใบยาวประมาณ 25 ซม. กว้างประมาณ 7.5 ซม.

ดอก : ดอกออกเป็นพวงมีสีเหลืองแสด ซึ่งลักษณะของสีและดอกจะ เหมือนกับดอกอโศกเขา แต่ต่างกันที่อโศกน้ำมีเกสรมากกว่ามี ประมาณ 6-8 อัน



ผล : มีลักษณะเป็นฝัก แบนขอบขนาน ยาวประมาณ 30 ซม.


ถิ่นกำเนิด : เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ใน ประเทศอินเดีย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ชอบขึ้นตามบริเวณชายน้ำริมลำธารทั่วไป

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ชอบน้ำและความชื้นมาก เจริญเติบโตได้ดีในดินอุดม่วนซุย

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :



การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด
ประโยชน์ : มีดอกที่สวยงามมากจึงเหมาะแก่การนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ
ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :
เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลพรรณไม้ เขต ก

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-185

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ptychosperma macarthurii* H. Craib.

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ชื่อสามัญ : Mac Arthur Palm

ชื่ออื่น ๆ : หมากเขียว

ลักษณะทั่วไป



ลำต้นเป็นกอสูง มีข้อปล้องเห็นชัดเจนสีเขียว ใบเป็นแบบขนนก ก้านทางใบยาว 2 – 3 ฟุต โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ใบย่อยมีสีเขียวแก่ ปลายใบตัดเหมือนใบชาดทุกใบ ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดเล็กสีเขียวอมเหลือง ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะมีสีแดง



ถิ่นกำเนิด : ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศนิวกีนิ

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : เป็นพืชกลางแจ้ง และที่รำไร

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ต้องการความชื้นปานกลาง

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งสถานที่

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

